



Centre d'Etudes Doctorales : Sciences et Techniques et Sciences Médicales

Avis de Soutenance

THESE DE DOCTORAT

Présentée par

Madame MARWA EL BALDI

Discipline : Sciences Médicale et Recherche Translationnelle
Spécialité : Epidémiologie

Sujet de la thèse

Profil épidémiologique de l'infection à SARS-CoV-2 dans des populations à haut risque d'exposition au début de la pandémie de COVID-19 au Maroc.

Formation Doctorale " Sciences Médicales et Recherche Translationnelle"

Thèse présentée et soutenue le **mercredi 16 septembre 2026 à 14h** à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et Médecine Dentaire de Fès, devant le jury composé de :

NOM ET PRÉNOM	TITRE	ÉTABLISSEMENT	
MOHAMED CHAKIB BENJELLOUN	PES	Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès	Président
NAIMA ABDA	PES	Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Oujda	Rapporteur
LATIFA ADARMOUCH	PES	Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech	Rapporteur
NADA OTMANI	Pr Agrégé	Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès	Rapporteur
NABIL TACHFOUTI	PES	Faculté de Médecine, de Pharmacie de Rabat	Examineur
SAMIRA EL FAKIR	PES	Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès	Examineur
OUAHIBA BHALLIL	PES	Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès	Examineur
KARIMA EL RHAZI	PES	Faculté de Médecine et de Pharmacie et Médecine Dentaire de Fès	Directeur de thèse
KHALID LAHMADI	Pr Agrégé	Faculté de Médecine et de Pharmacie et Médecine Dentaire de Fès	Co-Directeur de Thèse

Laboratoire de recherche : Epidémiologie et Recherche en sciences de la Santé
Etablissement : Faculté de Médecine et de Pharmacie et Médecine Dentaire de Fès





Centre d'Etudes Doctorales : Sciences et Techniques et Sciences Médicales

symptomatique et que les contacts familiaux présentaient des comorbidités. La fatigue était le symptôme prédominant chez les cas index, tandis que l'anosmie était plus fréquente chez les contacts familiaux. Malgré l'adhésion aux mesures d'hygiène et l'usage d'équipements de protection, certains facteurs biologiques, professionnels et sociodémographiques restaient déterminants dans le risque d'infection et la transmission intrafamiliale.

Conclusion : Cette étude fournit des données essentielles sur la prévalence de l'infection à SARS-CoV-2 et ses facteurs de risque chez les médecins et au sein des foyers familiaux marocains. Elle souligne la nécessité d'adapter les mesures de prévention en fonction du sexe, des comorbidités et du contexte professionnel, et d'intégrer des approches combinant virologie, sciences sociales et santé publique pour mieux préparer le Maroc aux futures épidémies.

Mots clés : Pandémie COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; prévalence COVID-19 ; Facteurs de risque ; populations à risque ; transmission intra-familiale ; taux d'attaque secondaire